

NOTICE D'INFORMATION CONCERNANT  
**LES PROTHÈSES AMOVIBLES****PRÉSENTATION**

Une prothèse amovible, communément appelée « dentier », est une prothèse qui peut s'enlever. Son but est de remplacer la ou les dents absentes qui n'ont pu être réparées pour des raisons physiologiques ou mécaniques. Elle peut remplacer les dents de façon permanente ou temporaire.

**La prothèse amovible partielle provisoire**

est une prothèse composée principalement de résine, avec des crochets en métal souple. Plutôt réservée à un usage temporaire, cette prothèse peut être utilisée comme un appareil de transition à la suite d'extractions récentes, dans l'attente d'un travail implantaire ou de la réalisation d'un stellite après cicatrisation osseuse optimale (3 mois minimum).

**La prothèse amovible partielle définitive**

(appelée stellite) est une prothèse à base métallique généralement en chrome cobalt molybdène rigide. Le châssis prend appui en partie sur les dents restantes (au moyen de crochets et taquets), en partie sur la gencive et l'os sous-jacent.

**La prothèse amovible complète en résine**

est réalisée quand le patient est complètement édenté. Elle ne prend appui que sur la gencive et os sous-jacent. A la mandibule (maxillaire inférieur), cette prothèse est très souvent stabilisée au moyen de deux implants en position de canine. Au maxillaire supérieur, la surface d'appui du palais et le phénomène physique dit « de succion » ou de « ventouse » offerte par la salive suffisent en générale à la parfaite stabilisation de la prothèse.



Toutefois, dans certains cas, l'utilisation de crèmes fixatives est recommandée pour majorer la stabilisation des prothèses amovibles. Avec le temps, l'os édenté n'étant plus stimulé par les dents, finit par perdre de son volume. Ces crèmes fixatives ne peuvent donc plus compenser la mobilité croissante de la prothèse. Dans ce cas précis, il faudra procéder à un rebasage de la prothèse (ajout de résine sur la prothèse pour compenser la fonte osseuse).

**Une prothèse paraît toujours encombrante les premiers jours. Il faut un certain temps à la langue et aux dents pour s'habituer à ce nouveau volume.**

**UN BON EXERCICE**

**S'entraîner à lire à haute voix, au besoin devant un miroir, pour s'habituer à ce nouveau contact. Il est normal de saliver davantage pendant quelques jours.**

**COMMENT NETTOYER VOTRE PROTHÈSE AMOVIBLE ?****1 RINÇAGE À L'EAU APRÈS CHAQUE REPAS**

- Passez la prothèse sous le robinet pour enlever les débris alimentaires.
- Rincez votre bouche à l'eau et brossez vous les dents et les muqueuses
- Remettez la prothèse humide : mettre en place la prothèse en pressant avec les doigts (ne pas mordre sur la prothèse pour la mettre en place).

**2 NETTOYAGE SOIGNEUX UNE FOIS PAR JOUR**

- Brossez l'intérieur et l'extérieur avec une brosse à prothèse et du savon doux (type savon de Marseille) au-dessus du lavabo rempli d'eau ou d'une serviette pour éviter une chute et une fracture de l'appareil.
- Retirez la crème fixative de votre appareil et de votre bouche tous les soirs
- Nettoyer dans une solution antibactérienne 1 fois par semaine en respectant le mode d'emploi. Bien rincer après utilisation.
- Ne jamais utiliser de produit javellisé plus de 10 minutes. Ne jamais utiliser d'eau bouillante ;
- Déposez la prothèse séchée dans une boîte avant le coucher.



Une prothèse neuve ou rebasée peut vous blesser les premiers jours : revenez nous voir, mais portez votre appareil quelques heures avant votre rendez-vous. La localisation de l'endroit de la blessure sera plus précise et la rectification de l'appareil plus aisée.

Dans le cas d'une prothèse stabilisée par des implants : pensez à consulter tous les ans. Les rétentions sur l'appareil peuvent s'user et être changées pour plus de confort. Entretien sa prothèse est essentiel pour une bonne santé bucco-dentaire, notamment pour éviter l'apparition d'inflammations gingivales (stomatites), ulcérations (aphtes), mycoses, etc...